

نقش گیرنده‌های GABA_A نواحی CA₁ هیپوکامپ در اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفین

سمیرا رضوی موحد

دانشگاه تهران، دانشکده علوم زیست‌شناسی

آمنه رضایوف

دانشگاه تهران، دانشکده علوم زیست‌شناسی

علی حائری روحانی

دانشگاه تهران، دانشکده علوم زیست‌شناسی

هنگامه ذات‌علی

دانشگاه تهران، دانشکده علوم زیست‌شناسی

هدف: هیپوکامپ از مراکز اصلی یادگیری وابسته به پاداش است و با در نظر گرفتن توزیع وسیع گیرنده‌های GABA_A در ناحیه CA₁ هیپوکامپ پشتی، احتمال می‌رود این گیرنده‌ها در یادگیری وابسته به پاداش نقش داشته باشند. در مطالعه حاضر، اثرات تزریق دو طرفه درون هیپوکامپی آگونیست یا آنتاگونیست گیرنده‌های GABA_A بر اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفین، در موش‌های بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است. **روش:** در این مطالعه تجربی- مداخله‌ای، از موش‌های بزرگ آزمایشگاهی نر بالغ، نژاد ویستار، با وزن تقریبی ۲۰۰ تا ۲۴۰ گرم استفاده شد. کلیه حیوانات با دستگاه استرئوتاکس در نواحی CA₁ هیپوکامپ پشتی به صورت دوطرفه کانول‌گذاری و پس از طی دوره ببود، وارد آموزش‌های شرطی‌سازی و القای «ترجیح مکان شرطی شده» (CPP) شدند. روش مورد استفاده برای CPP شامل یک دوره پنج روزه با سه مرحله مجزای زیر بود: ۱- مرحله پیش شرطی‌سازی؛ ۲- مرحله شرطی سازی؛ ۳- مرحله آزمون یا بیان پاداش.

یافته‌ها: تزریق زیر جلدی مقادیر مختلف مرفین در یک روش وابسته به تعداد، ترجیح یک مکان شرطی شده (CPP) را القا نمود. تزریق موسیمول، به عنوان آگونیست گیرنده GABA_A داخل CA₁، توانست CPP القا شده به وسیله مرفین را به طور معنی‌دار مهار کند. تزریق دوطرفه مقادیر مختلف بیکوکولین داخل نواحی CA₁ هیپوکامپ، همراه با یک مقدار بی‌اثر مرفین سبب القای معنی‌دار CPP گردید. موسیمول یا بیکوکولین به تنها یکی بر شرطی‌سازی مکانی اثری نداشتند. همچنین نتایج نشان دادند که واکنش القا شده به وسیله تزریق دو طرفه موسیمول به CA₁، با پیش‌تیمار به وسیله بیکوکولین برگشت‌پذیر است. از سوی دیگر، تزریق دو طرفه موسیمول یا بیکوکولین داخل CA₁، بیان CPP مرفین را به طور معنی‌دار کاهش داد، در حالی که بر فعالیت حرکتی در مرحله آزمون اثری نداشت. **نتیجه‌گیری:** نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که گیرنده‌های GABA_A نواحی CA₁ هیپوکامپ، در اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفین نقش مهمی به عهده دارند.

دکتر محمد رضا زرین‌دست^۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی

مقدمه

(القا شده به وسیله دارویی مانند مرفین) همراه شده بود، تعیین می‌شود (هافمن^۳؛ بلزانگ^۴ و باریو^۵؛ ناریتا^۶، اوکی^۷، ازاکی^۸، یاجیما^۹ و سوزوکی^{۱۰}، ۲۰۰۱). الگوی CPP نیازمند

«ترجیح مکان شرطی شده» (CPP)، یک روش حساس برای ارزیابی پاداش دارویی است که بر اساس آن میزان گرایش حیوانات آزمایشگاهی به محركی که قبلًا با یک حالت خوشایند

2- Conditioned Place Preference

3 - Hoffman

4- Belzung

5 - Barreau

6- Narita

7- Aoki

8- Ozaki


9 - Yajima

10- Suzuki

11 - Piepponen

۱- نشانی تماس: تهران، دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی.

E-mail: Zarinmr@ams.ac.ir



تحریکی و مهاری کورتکس و هیپوکامپ و نوروون‌های رابط (که نقش فعالی در فرآیندهای اطلاعاتی دارند) نقش کترلی دارد (پائولسن^{۲۸} و موذر^{۲۹}، ۱۹۹۸). مشخص شده است که آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های گیرنده GABA_A، به ترتیب موجب تضعیف و تقویت حافظه و یادگیری می‌شوند (فار^{۳۰}، فلود^{۳۱} و مورلی^{۳۲}، ۲۰۰۰؛ چاپوتیر^{۳۳}، ۲۰۰۴). به علاوه، مطالعات نشان داده‌اند که CPP یک الگوی یادگیری است (پیپون و همکاران، ۱۹۹۷؛ فریبتانو و مکدونالد، ۲۰۰۱) و یادگیری نیز نقش مهمی در توسعه پاداش اپیاتی دارد (وايت، ۱۹۹۶؛ لو^{۳۴}، زنگ^{۳۵}، لیو^{۳۶} و شنگ^{۳۷}، ۲۰۰۰). بنابراین در مطالعه حاضر، تأثیر گیرنده‌های GABA_A نواحی CA₁ هیپوکامپ پشتی بر اکتساب و بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفين بررسی شده است.


روش

در این مطالعه تجربی-مداخله‌ای از موش‌های بزرگ آزمایشگاهی^{۳۸} نر بالغ نژاد ویستار^{۳۹} با میانگین وزنی ۲۲۰ تا ۲۵۰ گرم استفاده شد. حیوانات از انتیتوپاستور ایران تهیه و در قفس‌های مخصوص نگهداری شدند. آب و غذای مخصوص به میزان کافی (به جز هنگام آزمایش) در دسترس آنها قرار داده می‌شد. محل نگهداری حیوانات از نظر شرایط فیزیکی دارای دوره روشنایی-تاریکی ۱۲ ساعته (روشنایی طی هفت صبح تا هفت شب) و دمای آن $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ بود. برای اینکه استرس و ترس ناشی از جابه‌جایی حیوانات از بین برود و به مکان جدید عادت کنند،

نمودار گیری ارتباط میان پاداش و مکان خاص است (پیپون^{۱۱}، کیواستیک^۱، کاتاجاماکی^۲، زارکوفسکی^۳ و آتسی^۴، ۱۹۹۷؛ فریبتانو^۵ و مکدونالد^۶، ۲۰۰۱). وايت^۷ (۱۹۹۶) معتقد است که سیستم هیپوکامپی در CPP نقش دارد و مطالعات نیز نشان داده‌اند که تخریب هیپوکامپ، موجب تضعیف CPP می‌شود (فریبتانو و مکدونالد، ۲۰۰۱).

مطالعات قبلی ما نشان می‌دهند که بین مراکز حافظه‌ای از جمله هیپوکامپ (کرمی، زرین‌دست، سپهری و صحرایی، ۲۰۰۲؛ رضایوف^۸، زرین‌دست، صحرایی و حائری روحانی، ۲۰۰۳) یا آمیگdal (رضایوف، زرین‌دست، صحرایی و حائری روحانی، ۲۰۰۲؛ زرین‌دست، رضایوف، صحرایی، حائری روحانی و رسولی ۲۰۰۳) و یادگیری وابسته به پاداش در CPP، ارتباط وجود دارد. به نظر می‌رسد انتقالات دوپامینزیک مزوپلیمیک از منطقه تگمنتوم شکمی به هسته اکومبنس، نقش مهمی در اثرات وابسته به پاداش مرفين ایفا می‌کند (مکبراید^۹، مورفی^{۱۰} و ایکموتو^{۱۱}؛ ناریتا و همکاران، ۲۰۰۱؛ کلی^{۱۲} و بربیج^{۱۳}، ۲۰۰۲). نوروون‌های GABA_B جزیی از سیستم دوپامینی مزوپلیمیک هستند که از طریق گیرنده‌های GABA، فعالیت نوروون‌های دوپامینزیک را تنظیم می‌کنند (گانگ^{۱۴}، نیل و جاستیس، ۱۹۹۸؛ پاناگیس^{۱۵} و کاستلاکیس^{۱۶}، ۲۰۰۲). به علاوه، نوروون‌های گاباائزیک تگمنتوم شکمی، انشعاباتی به سایر مراکز مغزی در گیر در فرآیندهای پاداشی رفتار می‌فرستند (سمبا^{۱۷} و فیسیگر^{۱۸}، ۱۹۹۲؛ وان بوکستل^{۱۹} و پیکل^{۲۰}، ۱۹۹۵). مهمترین ناقل عصبی یا نوروترانسミتر مهاری در سیستم عصبی است که روی دو گروه گیرنده اصلی تأثیر می‌گذارد. این گیرنده‌ها به دو گروه عملده یونوتروپیک (گیرنده‌های GABA_A/GABA_C) و متابوتروپیک (گیرنده GABA_B) تقسیم می‌شوند (بورمن^{۲۱}، ۲۰۰۰؛ سمیانو^{۲۲} و کولمن^{۲۳}، ۲۰۰۲). مشخص شده است که تزریق مزمن مرفين ممکن است گیرنده‌های GABA_A مرکزی را تنظیم کند (تیکو^{۲۴} و هافمن^{۲۵}، ۱۹۸۰). همچنین پیشنهاد شده است که مهار گیرنده‌های GABA_A متمرکز بر نوروون‌های دوپامینی ناحیه تگمنتوم شکمی، نقش مهمی در تنظیم آزادسازی دوپامین در هسته اکومبنس ایفا می‌کند (زی^{۲۶} و اشتاین^{۲۷}، ۲۰۰۲). GABA در ایجاد تعادل بین حالت‌های

1- Kivastic	2 - Katajamaki
3- Zharkovsky	4 - Ahtee
5- Ferbinteanu	6 - McDonald
7- White	8- Rezayof
9- McBride	10 - Murphy
11- Ikemoto	12 - Kelley
13- Berridge	14 - Gong
15- Panagis	16 - Kastellakis
17- Semba	18 - Fibiger
19- Van Bockstaele	20 - Pickel
21- Bormann	22 - Semyanov
23- Kullmann	24 - Ticku
25- Huffman	26 - Xi
27- Stein	28- Paulsen
29- Moser	30 - Farr
31- Flood	32 - Morley
33- Chapouthier	34 - Lu
35- Zeng	36 - Liu
37- Ceng	38- Rat
39- Wistar	



صورت دو طرفه، داخل نواحی CA₁ هیپوکامپ پشتی تزریق شدند. برای تزریق، حیوان به آرامی با دست نگه داشته شد تا دچار استرس و ترس نشود. بعد سیم‌های فولادی از داخل کانول راهنمای برداشته و کانول تزریق شماره ۲۷ به آرامی وارد یکی از کانول‌ها شد (کانول تزریق، ۰/۵ میلی‌متر بلندتر از کانول راهنمای بود). داروهای به وسیله کانول تزریق شماره ۲۷ که با یک رابط پلی‌اتیلنی به سرنگ هامیلتون وصل بود، تزریق شدند؛ بدین ترتیب که ۰/۵ میکرومتر از داروی موردنظر، به آرامی، به هر یک از دو ناحیه CA₁ (راست و چپ) هیپوکامپ پشتی حیوان تزریق شدند. زمان تزریق ۶۰ ثانیه بود و ۶۰ ثانیه هم کانول تزریق را داخل کانول راهنمای نگه داشتند تا دارو کاملاً در ناحیه مغزی مورد نظر جذب شود.

دستگاه ترجیح مکان شرطی شده (CPP)

دستگاه سه قسمتی ترجیح مکان شرطی شده، چوبی و بر اساس طرح کار^۸ و وايت (۱۹۸۳) ساخته شده است. دو قسمت اصلی A و B دستگاه، مساوی و دارای ابعاد $40 \times 30 \times 30$ سانتی‌متر می‌باشند، ولی تفاوت‌هایی دارند که آنها را از هم مشخص می‌کنند. دیواره قسمت A دستگاه، سفید رنگ است و نوارهای سیاه افقی به عرض دو سانتی‌متر و کف توری دارد و قسمت B دستگاه، سیاه رنگ است و دارای نوارهای عمودی سفید به عرض دو سانتی‌متر و یک کف صاف می‌باشد. قسمت سوم دستگاه، یعنی قسمت C، یک توول قرمز رنگ در ابعاد $15 \times 30 \times 40$ سانتی‌متر دارد که دو قسمت بزرگ A و B را به یکدیگر مرتبط می‌کند. دستگاه به وسیله یک در گیوتینی به سه بخش کاملاً مجزا تقسیم می‌شود. با برداشتن این در، حیوان می‌تواند از طریق توول C، آزادانه در قسمت‌های A و B حرکت کند.

آزمون رفتاری

روش ترجیح مکان شرطی شده، بر اساس طرح بدون سوگیری^۹ و طبق روش دفونسکا^{۱۰} و همکارانش (۱۹۹۵) پایه‌ریزی

حيوانات یک هفته قبل از آزمایش به آزمایشگاه منتقل شدند. در طول مدت سازش با محیط، هر حیوان فقط به مدت پنج دقیقه در دست قرار می‌گرفت تا کمتر دچار استرس شود و از هر حیوان در تمامی آزمایش‌ها، فقط یک بار استفاده شد.

داروهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: سولفات مرفين^۱ (شرکت تماد، تهران، ایران)، موسيمول (شرکت توکریس انگلستان) و بیکوکولین (شرکت سیگما آمریکا). کلیه داروهای جز بیکوکولین، درست قبل از آزمایش در محلول سرم فیزیولوژیک ۰/۹ درصد استریل حل شدند.

ابتدا بیکوکولین در یک تا دو قطره اسید استیک گلاسیال (با کمک سرنگ هامیلتون) حل و سپس به وسیله سرم فیزیولوژیک تا حجم پنج میلی‌متر رقیق گردید. موسيمول و بیکوکولین در نواحی CA₁ هیپوکامپ پشتی و مرفين به صورت زیرجلدی^۲ (SC) تزریق شدند. گروه‌های کنترل، سالین یا حامل^۳ دریافت می‌کردند.

روش جراحی حیوان و تزریق دارو

قبل از عمل جراحی و کانول‌گذاری، ابتدا حیوان با کتامین هیدروکلراید^۴ و زایلزین^۵ (با نسبت mg/kg ۱۰۰ کتامین به ۴ زایلزین) بی‌هوش شد. برای تهیه کانول راهنمای سر سرنگ شماره ۲۲، از جنس فولاد ضدزنگ به کار رفت. این کانول‌ها به صورت دو طرفه، با تعیین مختصات نواحی CA₁ هیپوکامپ پشتی از روی اطلس پاکسینوس^۶ و واتسون^۷ (۱۹۸۶) به اندازه یک میلی‌متر بالاتر از محل تزریق کار گذاشته شدند. مختصات اطلس برای ناحیه هیپوکامپ پشتی عبارت است از: قدامی - خلفی: ۳/۵ تا ۳- میلی‌متر از برگما؛ میانی - جانبی: 2 ± 0.8 میلی‌متر از خط وسط؛ شکمی - پشتی: ۳- تا ۲/۸ میلی‌متر از سطح جمجمه.

کانول تعییه شده، با سیمان دندانپزشکی محکم شد. برای جلوگیری از بسته شدن مجرای کانول تا زمان تزریق دارو، این مجرای با یک سیم فولادی ضد زنگ هم اندازه با کانول راهنمای که از سر سرنگ شماره ۲۷ تهیه شده بود، مسدود گردید. بعد از پایان جراحی، برای بهبود حیوانات و رفع استرس جراحی، یک هفته به آنها استراحت داده شد و بعد از پایان این مدت مورد آزمایش قرار گرفتند. داروهای گاباائزیک مورد نظر، از طریق کانول‌ها، به

1- morphine sulphate

2 - subcutaneously

3- vehicle

4 - ketamine hidrochloride

5- Xylazine


6 - Paxinos

7- Watson

8 - Carr

9- unbiased

10 - De fonseca



زمان سپری شده در قسمت A و B دستگاه برای وی ثبت و تغییر ترجیح^۳ به صورت تفاوت برحسب ثانیه محاسبه شد. در واقع این متغیر عبارت است از تفاضل زمان سپری شده در قسمتی که شرطی سازی با مرفين صورت گرفته در روز آزمون و روز پیش شرطی سازی. هر حیوان فقط یک بار وارد مرحله آزمون شد. برای مطالعه اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده GABA_A بر اکتساب ترجیح مکان شرطی شده، این داروها در مرحله شرطی سازی، در جلساتی که مرفين زیرجلدی تزریق می‌شد، قبل از مرفين و به صورت داخل مغزی تزریق شدند و در جلساتی که سالین زیرجلدی تزریق می‌شد، سالین یا حامل به صورت داخل مغزی تزریق گردید.

در مورد مطالعه اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده GABA_A بر بیان^۴ ترجیح مکان شرطی شده، در مرحله شرطی سازی هیچ گونه تزریق داخل مغزی صورت نگرفت و فقط در روز آزمون، پنج دقیقه قبل از اجرای آزمون، هر حیوان به صورت داخل مغزی داروها را دریافت کرد و بعد در دستگاه CPP قرار داده شد.

اندازه‌گیری فعالیت حرکتی حیوان

به منظور بررسی فعالیت حرکتی حیوان، کف هر یک از خانه‌های دستگاه CPP (A و B) با کشیدن دو خط عمود بر هم به چهار قسمت مساوی تقسیم شد. در روز آزمون هر بار که حیوان هر یک از این خطوط را قطع و از آن عبور می‌کرد، این عبور به عنوان یک فعالیت حرکتی ثبت شد.

مراحل آزمایش‌ها در نواحی CA1 هیپوکامپ پشتی
آزمایش‌ها روی گروه‌های آزمایشی که شامل هشت حیوان در هر گروه بود، انجام شد.

آزمایش اول

منحنی دوز - پاسخ برابی CPP مرفين

از تزریق زیر جلدی مقادیر متفاوت مرفين (۰/۵، ۲/۵، ۵ و ۷/۵ mg/kg)، برای بررسی توانایی آن در شرطی سازی مکانی استفاده

شده است. در این طرح، حیوان به هیچ قسمت دستگاه تمایل خاصی نشان نمی‌دهد. روش ترجیح مکان شرطی شده، شامل یک برنامه پنج روزه و سه مرحله مشخص است: پیش شرطی سازی^۱، شرطی سازی و آزمون (پس شرطی سازی^۲).


الف - مرحله پیش شرطی سازی. در اولین روز دوره که آن را روز آشنایی حیوان با محیط داخل دستگاه می‌خوانند، در گیوتینی برداشته و هر حیوان در قسمت C دستگاه گذاشته شد تا مدت ۱۵ دقیقه آزادانه در محیط دستگاه گردش کند و با محیط داخل قفس آشنا شود. زمان سپری شده هر حیوان در قسمت‌های A و B با کرونومتر اندازه گیری و ثبت گردید. در این روش، حیوانات به هیچ قسمت دستگاه تمایل خاصی نشان ندادند. تحلیل آماری نشان داد که زمان سپری شده برای گروه‌های هشت تایی موش‌ها در قسمت‌های A و B، اختلاف معنی داری نداشت. سپس برای شرطی شدن مکانی، حیوانات به طور تصادفی در نظر گرفته شدند.

ب - مرحله شرطی سازی. مرحله شرطی سازی، یک روز بعد از مرحله پیش شرطی سازی شروع شد. در گیوتینی در داخل دستگاه نصب و ارتیباط قسمت‌ها قطع شد. این مرحله سه روز طول کشید و شامل روزی دو نوبت تزریق (هشت صبح و دو بعد از ظهر) بود. صبح اولین روز این مرحله، حیوانات بلا فاصله بعد از تزریق زیرجلدی مرفين سولفات، به مدت ۴۵ دقیقه، در قسمت سفید دستگاه (A) قرار داده شدند. بعد از شش ساعت (عصر همان روز)، حیوانات به جای دارو، سالین دریافت کردند و به مدت ۴۵ دقیقه در قسمت سیاه دستگاه (B) قرار گرفتند. در طول مدت قرار گیری در هر قسمت، درهای گیوتینی بسته بودند. در دو مین روز، با حفظ شرایط زمانی روز قبل، حیوانات صبح سالین دریافت کردند و در قسمت سیاه قرار داده شدند و عصر دارو گرفتند و به مدت ۴۵ دقیقه در قسمت سفید حبس گردیدند. در سومین روز شرطی سازی، حیوانات مراحل تزریق را همانند روز اول طی کردند.

ج - مرحله آزمون (پس شرطی سازی). آزمون در روز پنجم، یعنی یک روز بعد از آخرین مرحله شرطی سازی اجرا شد. همانند روز قبل، در گیوتینی برداشته شد و هر حیوان به مدت ۱۵ دقیقه در دستگاه CPP آزادانه جستجو و گردش کرد. در این مدت،

1- preconditioning phase
3- change of preference

2 - post - conditioning or testing phase
4- expression



CA₁ هیپوکامپ، تزریق زیرجلدی سالین (1ml/kg) دریافت کرد. در طی اجرای مرحله آزمون، فعالیت حرکتی میزان ترجیح سنجیده شد.

ب- اثر ییکوکولین بر اکتساب CPP مرفین. مقادیر متفاوت ییکوکولین (۰/۰۵، ۰/۱ و ۱μg/rat) یا حامل (۱μl/rat) به ناحیه CA₁ هیپوکامپ پشتی چهار گروه از حیوانات تزریق شد و بلافاصله بعد از آن، در طی مرحله شرطی سازی، تزریق زیرجلدی مرفین (۰/۵mg/kg) صورت گرفت. کلیه گروه‌ها ۲۴ ساعت بعد از آخرین تزریق دارو، بدون هیچ گونه تزریقی، آزمایش شدند. در روز اجرای آزمون، فعالیت حرکتی نیز سنجیده شد.

آزمایش چهارم

اثر آنتاگونیست گیرنده GABA_A بر واکنش آگونیست این گیرنده در طی CPP مرفین در طی مرحله شرطی سازی، تزریق مقادیر مختلف موسیمول (۰/۰۵، ۰/۱ و ۱μg/rat) در ناحیه CA₁ هیپوکامپ، همراه با تزریق زیرجلدی آن (۵mg/kg) صورت گرفت. هشت گروه هشت‌تایی حیوانات در مرحله شرطی سازی، ابتدا به صورت داخل مغزی حامل (۱μl/rat) یا ییکوکولین (۱μl/rat) دریافت کردند و پنج دقیقه بعد از آن، در این گروه‌ها، تزریق‌های درون هیپوکامپ سالین (۱ml/rat) یا موسیمول (۰/۰۵ و ۰/۱μg/rat) و بلافاصله تزریق زیرجلدی مرفین (۵mg/kg) انجام شد. در روز آزمون، فعالیت حرکتی و میزان ترجیح بدون هیچ گونه تزریقی ارزیابی گردید.

آزمایش پنجم

اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده GABA_A بر بیان CPP مرفین

در طی مرحله شرطی سازی، تزریق زیرجلدی مرفین (۵mg/kg) به هشت گروه آزمایشی، CPP مرفین ایجاد کرد. در طول مرحله شرطی سازی، هیچ گونه تزریق داخل مغزی صورت نگرفت. در روز آزمون و قبل از اجرای آزمون، به CA₁ هیپوکامپ شش گروه حیوان موسیمول (۰/۰۵، ۰/۱ و ۱μg/rat) یا ییکوکولین (۰/۰۵ و ۰/۱μg/rat) تزریق شد و در پایان به مدت ۱۵ دقیقه در دستگاه CPP قرار داده شدند و فعالیت حرکتی و میزان ترجیح آنها

شد. چهار گروه از حیوانات، در مرحله شرطی سازی، به تناوب مرفین و سالین دریافت کردند. در طول مرحله شرطی سازی، یک گروه مجزا فقط سالین دریافت کرد که به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. در مرحله آزمون، تغییر ترجیح و فعالیت حرکتی سنجیده شد.

آزمایش دوم

اثر آگونیست گیرنده GABA_A همراه یا بدون مرفین بر اکتساب CPP


الف- اثر موسیمول بر اکتساب CPP. در طی مرحله شرطی سازی، درون هیپوکامپ (CA₁) سه گروه از حیوانات مقادیر مختلف موسیمول (۰/۰۵، ۰/۱ و ۱μg/rat) و بلافاصله سالین (۱ml/kg) تزریق شد. به علاوه، یک گروه کنترل در طی مرحله شرطی سازی، ابتدا سالین را به صورت داخل هیپوکامپ (CA₁) (۱μg/rat) و سپس یک تزریق زیرجلدی سالین (۱ml/kg) دریافت کرد. همه گروه‌ها ۲۴ ساعت بعد از آخرین تزریق داخل مغزی، شرطی سازی شدند و بدون هیچ گونه تزریقی، آزمایش و فعالیت حرکتی آنها نیز در طی مرحله آزمون ارزیابی گردید.

ب- اثر موسیمول بر اکتساب CPP مرفین. در طی مرحله شرطی سازی، داخل CA₁ هیپوکامپ پشتی چهار گروه از حیوانات، موسیمول (۰/۰۵، ۰/۱ و ۱μl/rat) یا سالین (۱μl/rat) تزریق شد و بلافاصله بعد از آن، تزریق زیرجلدی مرفین (۵mg/kg) صورت گرفت. تمامی گروه‌ها، ۲۴ ساعت بعد از آخرین تزریق دارو، بدون هیچ گونه تزریقی آزمایش شدند. فعالیت حرکتی آنها در مرحله آزمون نیز سنجیده شد.

آزمایش سوم

اثر آنتاگونیست گیرنده GABA_A همراه یا بدون مرفین بر اکتساب CPP

الف- اثر ییکوکولین بر اکتساب CPP. در طی مرحله شرطی سازی، داخل CA₁ هیپوکامپ سه گروه از حیوانات مقادیر مختلف ییکوکولین (۰/۰۵، ۰/۱ و ۱μg/rat) و بلافاصله بعد آن، سالین (۱mg/kg) به صورت زیرجلدی تزریق شد. در مرحله شرطی سازی، گروه کنترل همراه با تزریق حامل (۱μl/rat) داخل




که در نواحی CA₁ هیپوکامپ پشتی کانول گذاری شده‌اند، نشان داده شده است. آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه مشخص کرد که مرفین به صورت وابسته به مقدار، موجب افزایش معنی‌دار ترجیح مکان شرطی شده در حیوانات تحت آزمایش (نسبت به گروه کنترل) شده است $[F(4,35) = 19/12, p < 0.001]$. در مقادیر مختلف مرفین (۰/۵، ۲/۵، ۵ و ۷/۵ mg/kg) CPP معنی‌دار مشاهده شد. بیشترین واکنش با تزریق مقدار ۵mg/kg مرفین به دست آمد.

آزمایش دوم

اثر آگونیست گیرنده GABA_A همراه یا بدون مرفین بر اکتساب CPP. نمودار ۲ تأثیر تزریق دوطرفه داخل مغزی مقادیر مختلف موسمیول (۰/۵، ۰/۰۵ و ۰/۲۵ µg/rat) یا سالین (µl/rat) را بر اکتساب CPP در غیاب یا حضور مرفین (۵mg/kg) نشان می‌دهد. تحلیل واریانس دو طرفه، تداخل معنی‌دار موسمیول و مرفین را در اکتساب ترجیح مکان نشان داد [مقایسه درون گروهی: اثر تیمار: $F(1, 56) = 90/9, p < 0.01$; اثر مقدار: $F(3, 56) = 5/3, p < 0.01$; تداخل تیمار × مقدار: $F(3, 56) = 6/30, p < 0.001$].

به علاوه، تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تزریق موسمیول (۰/۰۵ و ۰/۲۵ µg/rat) به CA₁ هیپوکامپ به تنها یابی قادر به القای ترجیح مکان شرطی شده نمی‌باشد. در ضمن، موسمیول توانست ترجیح مکان القا شده به وسیله تزریق زیرجلدی مرفین (۵mg/kg) را در یک روش وابسته به مقدار به طور معنی‌دار مهار کند $[F(3, 56) = 7/8, p < 0.001]$.



در طی این مدت ارزیابی گردید.

بافت‌شناسی

در پایان آزمایش‌های CPP، داخل هر کانول ۵۰ میکرولیتر رنگ متیلن بلو یکدرصد تزریق شد. سپس حیوانات به وسیله کلروفورم کشته شدند و نهایتاً مغز آنها از جمجمه خارج گردید و به مدت ۱۰ روز در ظروف خاصی حاوی فرمالین ۱۰ درصد نگهداری شد تا بافت مغزی کاملاً تثیت شود. سپس از مغزهای تثیت شده، مقاطع مغزی تهیه شد و محل تزریق (که به وسیله متیلن بلو رنگی شده بود)، به کمک میکروسکوپ تشريح و بررسی و اطلاعات مربوط به موقعیت تزریق هر حیوان در دفتر ثبت گردید. موش‌هایی که کانول تزریق آنها در داخل هیپوکامپ پشتی (CA₁) قرار داشت، در تجزیه و تحلیل آماری دخالت داده شدند و موش‌هایی که فاقد کانول تزریق در نواحی CA₁ هیپوکامپ، از این تجزیه و تحلیل حذف گردیدند. در تجزیه و تحلیل‌های آماری ۹۵ درصد از حیوانات جراحی شده مورد استفاده قرار گرفتند و درصد باقی مانده، به دلیل کانول گذاری نادرست حذف شدند.

تحلیل آماری


در این مطالعه، تغییر در ترجیح، شاخص ارزیابی ترجیح مکان در نظر گرفته شد. نتایج به صورت میانگین \pm انحراف معیار از میانگین مقادیر متغیر ارائه گردید.

به منظور تعیین وجود اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های آزمایشی، از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک طرفه و دوطرفه و به دنبال آن از آزمون آماری توکی استفاده شد و اختلاف $p < 0.05$ تفاوت معنی‌دار تلقی گردید. برای انجام محاسبات آماری، از نرم‌افزارهای آماری INSTAT و SPSS و برای رسم نمودار S از نرم‌افزار سیگماپلات استفاده شد.

یافته‌ها

آزمایش اول

منحنی دوز - پاسخ برای CPP مرفین. در نمودار ۱ CPP تولید شده به وسیله تزریق زیرجلدی مقادیر مختلف مرفین به حیواناتی



نمودار ۳- اثرات تزریق دو طرفه بیکوکولین در CA₁ هیپوکامپ پشتی به تهایی یا همراه با مرفین بر اکتساب CPP؛ $p < 0.05$ * و $p < 0.01$ ** در مقایسه با گروه کنترل (سالین).


نمودار ۱- ترجیح مکان شرطی شده ناشی از تزریق مرفین در حیواناتی که در ناحیه CA₁ هیپوکامپ آن‌ها کانولگذاری شده است؛ $p < 0.05$ * و $p < 0.01$ ** در مقایسه با گروه کنترل (سالین).


نمودار ۴- اثرات تزریق دو طرفه بیکوکولین در CA₁ هیپوکامپ بر واکنش موسیمول در طی CPP مرفین؛ $p < 0.05$ * و $p < 0.01$ ** در مقایسه با گروه کنترل (سالین).

تحلیل واریانس دو طرفه، تأثیر تداخل معنی‌دار بیکوکولین و مرفین را بر اکتساب ترجیح مکان نشان داد. [مقایسه درون گروهی:
اثر تیمار: $p < 0.001$ ، $F(1, 34/7) = 56$ و ۱؛ اثر مقدار: $p < 0.05$ ، $F(3, 5) = 56$ و ۳؛ اثر تداخل تیمار × مقدار: $p < 0.01$ ، $F(3, 5) = 1/4$ ، $p < 0.05$].
به علاوه، تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که صرف تزریق بیکوکولین (0.25 ، 0.5 و 1 mg/rat) داخل CA₁ هیپوکامپ نتوانسته است ترجیح مکان معنی‌داری را القا کند $[p > 0.05]$ (۰.۲ و 0.5 F(۴، ۳۵) و 1 F(۴، ۳۵)). همچنین، بیکوکولین ترجیح مکان القا شده به وسیله مرفین (0.5 mg/kg) را تقویت کرد $[p < 0.01$ ، $1 = 5/1$ و $28 = 5/0$ F(۳، ۰)].

نمودار ۲- اثرات تزریق دو طرفه موسیمول در ناحیه CA₁ هیپوکامپ به تهایی یا همراه با مرفین بر اکتساب ترجیح مکان شرطی شده؛ $p < 0.05$ * و $p < 0.01$ ** در مقایسه با گروه کنترل (سالین).


آزمایش چهارم
اثر آنتاگونیست گیرنده GABA_A بر واکنش آگونیست آن در طی CPP مرفین. نمودار ۴ اثر تزریق‌های درون هیپوکامپی (CA₁) بیکوکولین (0.25 ، 0.5 و 1 μg/rat) را بر تغییرات القا شده به وسیله تزریق زیرجلدی مرفین (5 mg/kg) همراه با تزریق درون هیپوکامپی (CA₁) (0.25 ، 0.5 و 1 μg/rat) نشان می‌دهد.
تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد که بیکوکولین، اثر مهاری موسیمول را بر پاسخ مرفین معکوس می‌کند [مقایسه درون گروهی: اثر تیمار: $p < 0.001$ ، $F(1, 13) = 56$ و ۱؛ اثر مقدار:





در مطالعه حاضر، دخالت گیرنده‌های GABA_A نواحی CA1 همیوکامپ پشتی بر ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفين CPP ببررسی شد. همانند مطالعات قبلی (سوزوکی^۱، تسودا^۲، فونادا^۳ و میساوا^۴، ۱۹۹۵؛ شیپنبرگ^۵، هایدبردر^۶ و لف سور^۷، ۱۹۹۶؛ کیواستیک^۸، وریکالاس^۹، پیونن، زارکوفسکی^{۱۰} و آتی^{۱۱}، ۱۹۹۶)، آزمایش ما نیز نشان داد که تزریق زیر جلدی مرفين به صورت وابسته به مقدار، ترجیح مکان شرطی شده را آشکار می‌نماید. این یافته مطالعات قبلی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که اثرات پاداشی آگونسیت گیرنده اوپیوئیدی می‌تواند به وسیله محرک‌های محیطی که قبلاً حیوان در آن محیط پاداش گرفته است، شرطی شود.^{۱۲}

انتقال دوپامینرژیک مزولیمیک از ناحیه تگمتوم شکمی به هسته آکومبنس و سایر نواحی لیمیک مغز پیشین، نقش مهمی در اثرات وابسته به پاداش مرفین اینفا می کند (کوب^{۱۲}، ۱۹۹۲؛ ماتس^{۱۳}، ۱۹۹۷؛ برادلی^{۱۴}، سالوگر^{۱۵} و براون^{۱۶}، ۱۹۹۶؛ مالدونادو^{۱۷} و همکاران، ۱۹۹۹؛ مکبرد^{۱۸} و همکاران، ۱۹۹۷). همچنین بسیاری از مطالعات نشان داده اند که آزادسازی دوپامین مزولیمیک و شلیک سلول های دوپامینی، به وسیله انتقالات GABA و نورون های رابط گابائترژیک درون ناحیه تگمتوم شکمی مهار می شوند (استفسن^{۱۹}، اسوینگاس^{۲۰}، پیکل^{۲۱} و هنریکسون^{۲۲}، ۱۹۹۸؛ وسترینک^{۲۳}، انریکو^{۲۴}، فیمن^{۲۵}، دی و رایس^{۲۶}، ۱۹۹۸؛ ازیکو، بوما^{۲۷}، دی و رایس و وستر میک، ۱۹۹۸). اگرچه سیستم دوپامینی مزولیمیک در اثرات پاداشی مرفین نقش اصلی را بازی می کند، اما مطالعات به طور قوی پیشنهاد می کنند که سلول های گابائترژیک، گلوتاماترژیک و سرتوزنرژیک در ناحیه تگمتوم شکمی و نیز لمیک مغز جلویی مهم هستند (لشنر^{۲۸}، ۱۹۹۷). تحقیقات نشان



نمودار ۵- اثرات ترتیق دو طرفه موسیمول یا بیکوکولین داخل CA₁ هیپوکامپ بر بیان ترجیح مکان شرطی شده (CPP) ناشی از مرفین؛ $p < 0.05$ و $p < 0.001$ در مقایسه با گروه کنترل (سالین).


آزمایش پنجم

اثر آگونیست یا آنتاگونوئیست گیرنده GABA_A بر بیان ناشی از مرفین. نمودار ۵ اثرات تزریق دو طرفه CA موسیمول یا بیکوکولین را بر بیان CPP ناشی از مرفین (5mg/kg) نشان می دهد. تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تیمار با موسیمول (۰/۲۵، ۰/۰۵ و ۰/۰۱) (µg/rat، $p < 0/0001$) یا بیکوکولین (۰/۰۵ و ۰/۰۱) (µg/rat، $p < 0/01$)، بیان CPP مرفین (۰/۴ و ۰/۳) (µg/rat، $p < 0/01$) را به طور معنادار کاهش داده است.

اثر داروها بر فعالیت حرکتی

تحلیل آماری نشان داد که تزریق مقادیر مختلف مرغین یا موسیمول (۰/۵-۷/۵mg/kg) در طول مرحله ییکوکولین (۰/۵ و ۱ μ g/rat)، به تنها یابی، آزمون، بر فعالیت حرکتی آزمودنی تأثیر نداشته است. تزریق دو طرفه داخل CA₁ موسیمول یا ییکوکولین همراه با تزریق زیرجلدی مرغین نیز نتوانست هیچ تأثیری بر فعالیت حرکتی گروه آزمایشی داشته باشد.

دھن



مطلوب را تأیید می‌کند (رضایوف و همکاران، ۲۰۰۳). همچنین به نظر می‌رسد که گیرنده‌های GABA_A نواحی CA₁ هیپوکامپ پشتی، خودشان در شروع پاسخ پاداشی دخالتی ندارند.

نتایج حاضر نشان می‌دهند که تزریق دو طرفه داخل مغزی موسمیول در CA₁ CPP مرفین را در یک روش وابسته به مقدار به طور معنی دار مهار می‌کند. به نظر می‌رسد که احتمالاً آگونیست گیرنده‌های GABA_A، اکتساب CPP مرفین را از طریق کاهش پاداش مرفین کاهش داده‌اند که این با گزارش‌های قبلی مطابقت دارد. برای مثال، نشان داده شده است که تزریق موسمیول، خودتحریکی نیکوتین را در مosh‌های آموزش دیده کاهش می‌دهد (کوریگال^۱، کوئن^{۱۷}، آدامسون^{۱۸}، چو^{۱۹} و زانگ^{۲۰}). ۲۰۰۰. به علاوه، پیشنهاد شده است که افزایش تراکم GABA مزویمیک، اکتساب خود تزریقی هروئین را مسدود می‌کند (زی و استین، ۲۰۰۰). از سوی دیگر، با توجه به اینکه نورون‌های گاباژرژیک هیپوکامپ ممکن است در فرآیند یادگیری و حافظه دخالت داشته باشند (ورتس^{۲۱} و کوکسیس^{۲۲}؛ پائولسن و موزر، ۱۹۹۸) و همچنین هیپوکامپ پشتی خود در یادگیری وابسته به پاداش دخالت دارد (رضایوف و همکاران، ۲۰۰۳)، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تزریق موسمیول داخل CA₁، این نوع یادگیری را کاهش می‌دهد. همچنین نتایج حاضر مؤید آن است که ممکن است تغییرات CPP مرفین، به وسیله فعالیت گیرنده‌های GABA_A، با حافظه ارتباطی رابطه داشته باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، نتایج حاضر می‌تواند مشابه نتایج تحقیقات سایر محققان (که تزریق موسمیول را عامل فراموشی پاداش می‌دانند) باشد (سالیناس^{۲۳} و مک‌گاف^{۲۴}، ۱۹۹۵).


بررسی‌های ما نشان می‌دهند که مقدار کم مرفین (۰/۵mg/kg) که نتوانسته است CPP را القا کند، همراه با بیکوکولین، موجب

داده‌اند که فعالیت GABA در پاداش اوپیوئیدی، به طور ویژه، به وسیله گیرنده‌های GABA_A تنظیم می‌شود (لاویولت^{۲۹} و وندرکوی^{۳۰}، ۲۰۰۱). به علاوه، شواهد اخیر پیشنهاد می‌کند که اثرات درون‌زای نورون‌های رابط گاباژرژیک، بر سلول‌های دوپامینی تگمتوم شکمی از طریق گیرنده‌های GABA_A تنظیم می‌شود (سوچیتا^۱، جانسون^۲ و نورت^۳، ۱۹۹۲؛ کالیوس^۴، چرچیل^۵ و کلیتیسک^۶، ۱۹۹۳). گیرنده‌های GABA_A با مهار کردن آزادسازی دوپامین از تگمتوم شکمی و لیمیک مغز جلویی، اثرات تقویتی را تنظیم می‌کنند. مطالعات نشان داده‌اند که گیرنده‌های GABA_A در وابستگی دارویی نقش پیچیده‌ای دارند (مالکولم^۷، ۲۰۰۳).

با در نظر گرفتن این مطلب که هیپوکامپ در وابستگی روانی و دارویی (نستلر^۸ و آقاجانیان^۹، ۱۹۹۷؛ نستلر، ۲۰۰۱) و نیز رفتار جست‌وجوی دارویی (ورل^{۱۰}، لیو^{۱۱}، هایس^{۱۲}، اسپکتور^{۱۳} و گاردنر^{۱۴}، ۲۰۰۱) نقش دارد، به نظر می‌رسد که تحریک و مهار گیرنده‌های GABA_A هیپوکامپ پشتی بتواند اکتساب و بیان ترجیح مکان ناشی از مرفین را تغییر دهد.

مطالعه حاضر نشان داد که تزریق آگونیست (موسمیول) یا آنتاگونیست (بیکوکولین) گیرنده GABA_A، در نواحی CA₁، به تنهایی نمی‌تواند ترجیح مکان شرطی شده یا اجتناب مکانی شرطی شده معنی داری را به وجود آورد. به هر حال، نشان داده شده است که تزریق داخل تگمتوم شکمی موسمیول، اثرات پاداشی خود تحریکی پالیدوم شکمی را کاهش می‌دهد (پاناگایس و کاستلاکیس، ۲۰۰۲). همچنین گزارش شده است که تزریق دو طرفه موسمیول یا بیکوکولین داخل تگمتوم شکمی، در روش اندازه‌گیری به وسیله CPP، اثر پاداشی مشخص و برجسته‌ای دارد (لاویولت و وندرکوی، ۲۰۰۱). یک مطالعه میکرودیالیز داخل مغزی نشان داد که تزریق بیکوکولین، یک افزایش معنی دار و وابسته به مقدار را در دوپامین خارج سلولی هسته آکومبنس ایجاد می‌کند (یان^{۱۵}، ۱۹۹۹). از آنجا که تزریق درون هیپوکامپی آگونیست و آنتاگونیست GABA_A نتوانسته است CPP را القاء نماید، می‌توان چنین نتیجه گرفت که هیپوکامپ به تنهایی در سازوکارهای پاداشی دخالت ندارد که مطالعات قبلی ما نیز این

1- Sugita	2- Johnson
3- North	4- Kalivas
5 - Churchill	6- Klitenick
7- Malcolm	8- Nestler
9- Aghajanian	10- Vorel
11- Liu	12- Hayes
13- Spector	14- Gardner
15- Yan	16- Corrigall
17- Coen	18- Adamson
19- Chow	20- Zhang
21- Vertes	22- Kocsis
23- Salinas	24- McGaugh



روش‌های رفتاری معکوس کرده است (مویر^{۱۶}، راینر^{۱۷} و اوریت^{۱۸}). بنابراین، نتایج حاضر ثابت می‌کند که کاهش GABA_A پاداش مرفین به وسیله موسیمول، از طریق گیرنده‌های GABA_A تنظیم می‌شود.

از سوی دیگر، پژوهش حاضر اثرات تزریق داخل_۱ CA_۱ آگونیست گیرنده GABA_A یا آنتاگونیست آن بر بیان CPP مرفین را نیز مطالعه کرده است که نتایج آن نشان می‌دهند تزریق دوطرفه داخل_۱ CA_۱ مقادیر مختلف موسیمول یا بیکوکولین، بلا فاصله قبل از مرحله آزمون، به طور معنی‌داری از بیان CPP مرفین (5mg/kg) ممانعت می‌کند. اگرچه مهار گیرنده GABA_A در طول اکتساب، CPP مرفین را تقویت کرد، بیان CPP مرفین به وسیله بیکوکولین CA_۱ مهار شد. مشابه آن، تزریق داخل_۱ CA_۱ موسیمول، از بیان CPP مرفین ممانعت کرد. بنابراین، آگونیست و آنتاگونیست گیرنده مرفین باعث کرد. بر بیان CPP مرفین اثر مشابه دارند. لذا به نظر می‌رسد که فعالیت یا مهار گیرنده‌های GABA_A هیپوکامپ پشتی، نقش مهمی در بیان CPP مرفین بازی کند.

از آنجا که هم آگونیست و هم آنتاگونیست، القا کننده یک اثر هستند، مطالعه بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن تمامی یافته‌ها، می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که گیرنده‌های GABA_A نواحی CA_۱ هیپوکامپ پشتی، در القای پاداش ناشی از مرفین و ایجاد ترجیح مکان شرطی شده نقش مهمی بازی می‌کنند.

- 1- Floresco
- 3- Yang
- 5- Brioni
- 7- Gamboa
- 9- Medina
- 11- Luft
- 13- Cammurota
- 15- Eberhardt

- 2- Blaha
- 4- Phillips
- 6- Decker
- 8- Izquierdo
- 10- Nagahara
- 12- Pereira
- 14- Duffy
- 16- Muir

القای CPP می‌شود. یک گزارش نشان می‌دهد که مسدود شدن گیرنده‌های GABA_A در تگمتوم شکمی قدمامی، آزادسازی دوپامین را در هسته آکومبنس تقویت می‌کند (مالکولم، ۲۰۰۳). با توجه به اینکه، امکان ورودی‌های دوپامینزیکی از هیپوکامپ به هسته آکومبنس وجود دارد (فلورسکو^{۱۱}، بلاهای^{۱۲}، یانگ^{۱۳} و فیلیپس^{۱۴}، ۲۰۰۱)، ممکن است بیکوکولین در نواحی CA_۱ هیپوکامپ پشتی، ویژگی‌های دوپامینی مرفین را در هسته آکومبنس تقویت کند.

از سوی دیگر، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که گیرنده‌های GABA_A ثبت حافظه را تنظیم می‌کنند (بریونی^{۱۵}، دکر^{۱۶}، گامبوا^{۱۷}، ایزکوئردو^{۱۸} و مک‌گاف، ۱۹۹۰؛ ایزکوئردو و مدینا^{۱۹}، ۱۹۹۱؛ ناگاها را^{۲۰} و مک‌گاف، ۱۹۹۲). تزریق داخل_۱ CA_۱ بیکوکولین، نگهداری حافظه را افزایش می‌دهد (لوفت^{۲۱}، پریرا^{۲۲}، کاماروتا^{۲۳} و ایزکوئردو، ۲۰۰۴). گزارش شده است که تزریق دو طرفه بیکوکولین داخل آمیگدا، حافظه را برای افزایش پاداش تقویت می‌کند (سالیناس و مک‌گاف، ۱۹۹۶) و از آنجا که CPP یک روش یادگیری وابسته به پاداش است (بیرونی و همکاران، ۱۹۹۷؛ فربین‌تانو و مک‌دونالد، ۲۰۰۱)، احتمالاً بیکوکولین همراه با پایین‌ترین مقدار مرفین، یادگیری را افزایش می‌دهد و در حقیقت ترجیح مکان شرطی شده را تقویت می‌کند.

نتایج همچنین نشان دادند که تزریق دوطرفه داخل_۱ CA_۱ بیکوکولین، در طول مرحله شرطی‌سازی، اثرات کاهشی CPP القا شده به وسیله موسیمول را معکوس می‌کند. در حمایت از نتایج حاضر، بررسی‌های سایر محققان نشان داده است که تزریق داخل تگمتوم شکمی بیکوکولین اثرات موسیمول را بر فعالیت حرکتی معکوس می‌کند (کالیواس، دافی^{۱۴} و ابرهارد^{۱۵}، ۱۹۹۰). تزریق دو

منابع

17 -Robbins


18- Everitt

طرفه بیکوکولین در قاعده مغز جلویی نیز، اثرات موسیمول را در

Belzung, C., & Barreau, S. (2000). Differences in drug-induced place conditioning between BALB/c and C57BL/6 mice. *Pharmacology Biochemistry & Behavior*, 65, 419-423.

Bormann, J. (2000). The “ABC” of GABA receptors. *Trends in Pharmacological Sciences*, 21, 16-19.

Brioni, J. D., Decker, M. W., Gamboa, L. P., Izquierdo, I., & McGaugh, J. L. (1990). Muscimol injections in the medial septum impair spatial learning. *Brain Research*, 522, 227-234.



Carr, G. D., & White, N. M. (1983). Conditioned place preference from intraaccumbens but not intra-caudate amphetamine injections. *Life Sciences*, 33, 2551-2557.

Chapouthier, G. (2004). From the search for a molecular code of memory to the role of neurotransmitters: a historical perspective. *Neural Plasticity*, 11, 151-158.

Corrigall, W. A., Coen, K. M., Adamson, K. L., Chow, B. L., & Zhang, J. (2000). Response of nicotine self-administration in the rat to manipulations of mu-opioid and gamma-aminobutyric acid receptors in the ventral tegmental area. *Psychopharmacology*, 149, 107-114.

De fonseca, F. R., Rubio, P., Martin-Calderon, J. L., Caine, S. B., Koob, G. F., & Navarro, M. (1995). The dopamine receptor agonist 7-OH-DPAT modulates the acquisition and expression of morphine – induced place preference. *European Journal of Pharmacology*, 274, 47-55.

Enrico, P., Bouma, M., de Vries, J. B., Westerink, BH. (1998). The role of afferents to the ventral tegmental area in the handling stress-induced increase in the release of dopamine in the medial prefrontal cortex: a dual-probe microdialysis study in the rat brain. *Brain Research*, 779, 205-213.

Farr, S. A., Flood, J. F., & Morley, J. E. (2000). The effect of cholinergic, GABAergic, serotonergic, and glutamatergic receptor modulation on posttrial memory processing in the hippocampus. *Neurobiology of learning and memory*, 73, 150-167.

Ferbinteanu, J, & McDonald, R. J.(2001). Dorsal/ventral hippocampus, fornix, an conditioned place prefernece. *Hippocampus*, 11, 187-200.

Floresco, S. B., Blaha, C. D., Yang, C. R., & Phillips, A. G. (2001). Modulation of hippocampal and amygdalar-evoked activity of nucleus accumbens neurons by dopamine: cellular mechanisms of input selection. *The Journal of neuroscience*, 21, 2851-2860.

Gong, W., Neill, D. B., Justice, JB., J. B. Jr. (1998). GABAergic modulation of ventral pallidal dopamine release studied by in vivo microdialysis in the freely moving rat. *Synapse*, 29, 406-412.

Hoffman, D. C. (1989). The use of place conditioning in studying the neuropharmacology of drug reinforcement. *Brain Research*, 23, 373-387.

Izquierdo, I., & Medina, J. H., (1991). GABA_A receptor modulation of memory: the role of endogenous benzodiazepines. *Trends in Pharmacological Sciences*, 12, 260-265.

Kalivas, P. W., Duffy, P., & Eberhardt, H. (1990). Modulation of A10 dopamine neurons by gamma-aminobutyric acid agonists. *The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 25, 858-866.

Kalivas, P. W., Churchill, L., & Klitenick, M. A. (1993). GABA and enkephalin projection from the nucleus accumbens and ventral pallidum to the ventral tegmental area. *Neuroscience*, 57, 1047-1060.

Karami, M., Zarrindast, M. R., Sepehri, H., & Sahraei, H. (2002). Role of nitric oxide in the rat hippocampal CA1 area on morphine-induced conditioned place preference. *European Journal of Pharmacology*, 449, 113-119.

Kelley, A. E., & Berridge, K. C. (2002). The neuroscience of natural rewards: relevance to addictive drugs. *Journal of Neuroscience*, 22, 3306-3311.

Kivastik, T., Vuorikallas, K., Piepponen, T. P., Zharkovsky, A., & Ahtee, L. (1996). Morphine – and cocaine – induced conditioned place preference: effects of quinpirole and preclamol. *Pharmacology Biochemistry & Behavior*, 54, 371-375.

Koob, G. F. (1992) . Drugs of abuse: anatomy, pharmacology and function of reward phathway. *Trends in Pharmacological Sciences*, 13, 177-184.

Laviolette, S.. R., & van der Kooy, D. (2001). GABA (A) receptors in the ventral tegmental area control bidirectional reward signalling between dopaminergic and non-dopaminergic neural motivational systems. *European Journal of Neuroscience*, 13, 1009-1015.

Leshner, A. I. (1997). Addiction is a brain disese, and it matters. *Science*, 278, 45-47.

Luft, T., Pereira, G. S., Cammarota, M., & Izquierdo, I. (2004). Different time course for the memory facilitating effect of bicuculline in hippocampus, entorhinal cortex, and posterior parietal cortex of rats. *Neurobiology of learning and memory*, 82, 5652-5656.

Lu, L., Zeng, S., Liu, D., & Ceng, X. (2000). Inhibition of the amygdala and hippocampal calcium/calmodulin-dependent protein kinase II attenuates the dependent protein kinase II attenuates the dependence and relapse to morphine differently in rats. *Neuroscience letters*, 291, 191-195.


Malcolm, R. J. (2003). GABA systems, benzodiazepines, and substance dependence. *Journal of Clinical Psychiatry*, 3, 36-40.

Maldonado, R., Saiardi, A., Valverde, O., Samad, T. A., Roques B. P., & Borrelli, E. (1997). Absence of opiate rewarding effects in mice lacking dopamine D2 receptors. *Nature*, 388, 586-589.

Mattes, C., Bradley, R., Salughter, E., & Browne, S. (1996). Cocaine and butyrylcholinesterase (BChE): determination of enzymatic parameters. *Life Sciences*, 58, 257-261.

McBride, W. J., Murphy, J. M., & Ikemoto, S. (1999). Localization of brain reinforcement mechanisms: intracranial self-administration and intracranial place-conditioning studies. *Behavioural Brain Research*, 101, 129-152.

Muir, J. L., Robbins, T. W., & Everitt, B. J. (1992). Disruptive effects of muscimol infused into the basal forebrain on conditional discrimination and visual attention: differential interactions with cholinergic mechanisms. *Psychopharmacology*, 107, 541-550.



- Nagahara, A. H., & McGaugh, J. L. (1992). Muscimol infused into the medial septal area impairs long-term memory but not short-term memory in inhibitory avoidance, water maze place learning and rewarded alternation tasks. *Brain Research*, 54, 591-561.
- Narita, M., Aoki, T., Ozaki, S., Yajima, Y., & Suzuki, T. (2001). Involvement of protein kinase C γ isoform in morphine-induced reinforcing effects. *Neuroscience*, 103, 309-314.
- Nestler, E. J., & Aghajanian, G. K. (1997). Molecular and cellular basis of addiction. *Science*, 278, 58-63.
- Nestler, E. J. (2001). Neurobiology. Total recall – the memory of addiction. *Science*, 292, 2266-2267.
- Panagis, G., & Kastellakis, A. (2002). The effects of ventral tegmental administration of GABA (A), NMDA and AMPA receptor agonists on ventral pallidum self-stimulation. *Behavioural Brain Research*, 131, 115-123.
- Paulsen, O., & Moser, E. I. (1998). A model of hippocampal memory encoding and retrieval: GABAergic control of synaptic plasticity. *Trends in Neurosciences*, 21, 273-278.
- Paxinos, G., & Watson, C. (1986). *The rat brain in stereotaxic coordinates*. Academic Press, Sydney.
- Piepponen, T. P., Kivastik, T., Katajamaki, J., Zharkovsky, A., & Ahtee, L. (1997). Involvement of opioid mu 1 receptors in morphine-induced conditioned place preference in rats. *Pharmacology Biochemistry & Behavior*, 58, 275-279.
- Rezayof, A., Zarrindast, M. R., Sahraei, H., & Haeri-Rohani, A. (2002). Involvement of dopamine D2 receptors of the central amygdala on the acquisition and expression of morphine-induced place preference in rat. *Pharmacology Biochemistry & Behavior*, 74, 187-197.
- Rezayof, A., Zarrindast, M. R., Sahraei, H., & Haeri-Rohani, A. (2003). Involvement of dopamine receptors of the dorsal hippocampus on the acquisition and expression of morphine-induced place preference in rats. *Journal of Psychopharmacology*, 17, 415-423.
- Salinas, J. A., & McGaugh, J. L. (1995). Muscimol induces retrograde amnesia for changes in reward magnitude. *Neurobiology of learning and memory*, 63, 277-285.
- Salinas, J. A., & McGaugh, J. L. (1996). The amygdala modulates memory for changes in reward magnitude: involvement of the amygdaloid GABAergic system. *Behavioral Brain Research*, 80, 87-98.
- Semba, K., & Fibiger, H. C. (1992). Afferent connections of the laterodorsal and the pedunculopontine tegmental nuclei in the rat: a retro- and antero-grade transport and immunohistochemical study. *The Journal of comparative neurology*, 323, 387-410.
- Semyanov, A., & Kullmann, D. M. (2002). Relative picrotoxin insensitivity distinguishes ionotropic GABA receptor-mediated IPSCs in hippocampal interneurons. *Neuropharmacology*, 43, 726-736.
- Shippenberg, T. S., Heidbreder, C., & Lefevour, A. (1996). Sensitization to the conditioned rewarding effects of morphine: pharmacology and temporal characteristics. *European Journal of Pharmacology*, 299, 33-39.
- Steffensen, S. C., Svingos, A. L., Pickel, V. M., & Henriksen, S. J. (1998). Electrophysiological characterization of GABAergic neurons in the ventral tegmental area. *The Journal of neuroscience*, 18, 8003-8015.
- Sugita, S., Johnson, S. W., & North, R. A. (1992). Synaptic inputs to GABA_A and GABA_B receptors originate from discrete afferent neurons. *Neuroscience letters*, 134, 207-211.
- Suzuki, T., Tsuda, M., Funada, M., & Misawa, M. (1995). Blockade of morphine-induced place preference by diazepam in mice. *European Journal of Pharmacology*, 280, 327-330.
- Ticku, M. K., & Huffman, R. D. (1980). The effects of acute and chronic morphine administration on GABA receptor binding. *European Journal of Pharmacology*, 68, 97-106.
- Van Bockstaele, E. J., &, Pickel, V. M. (1995). GABA-containing neurons in the ventral tegmental area project to the nucleus accumbens in rat brain. *Brain Research*, 68, 215-221.
- Vertes, R. P., & Kocsis, B. (1997). Brainstem-diencephalo-septohippocampal systems controlling the theta rhythm of the hippocampus. *Neuroscience*, 81, 893-926.
- Vorel, S. R., Liu, X., Hayes, R. J., Spector, J. A., & Gardner, E. L. (2001). Relapse to cocaine-seeking after hippocampal theta burst stimulation. *Science*, 292, 1175-1178.
- Westerink, B. H., Enrico, P., Feimann, J., & De Vries, J. B. (1998). The pharmacology of mesocortical dopamine neurons: a dual – probemicrodialysis study in the ventral tegmental area and prefrontal cortex of the rat brain. *The Journal of pharmacology and experimental therapeutics*, 285, 143-154.
- White, N. M. (1996). Addictive drugs as reinforcers: multiple partial actions on memory systems. *Addiction*, 91, 921-949.
- Xi, Z. X., & Stein, E. A. (2002). GABAergic mechanisms of opiate reinforcement. *Alcohol Alcohol*, 37, 484-494.
- Yan, Q. (1999). Focal bicuculline increases extracellular dopamine concentration in the nucleus accumbens of freely moving rats as measured by in vivo microdialysis. *European Journal of Pharmacology*, 385, 7-13.
- Zarrindast, M. R., Rezayof, A., Sahraei, H., Haeri-Rohani, A., Rassouli, Y. (2003). Involvement of dopamine D1 receptors of the central amygdala on the acquisition and expression of morphine-induced place preference in rat. *Brain Research*, 965, 212-221.

